

Zapote cabello

Licania platypus (Hemsl.) Fritsch

Familia Chrysobalanaceae. *Sonzapote, sunzapote, sungano, zapote cabelludo, zapote o sangre* (Costa Rica); *Sonzapote* (El Salvador); *Zapote amarillo, zapote borracho, zapote cabello, zapote de mico, zapote de mono, mesonsapote, mesonzapote, cabeza de mico o de caca de niño* (México).

Descripción. Árbol erecto, majestuoso, alcanza de 30 a 50 m de altura, tiene una corona redondeada.

Árboles similares. Podría confundirse con *Calatola laevigata* en la textura de la corteza y presencia de exudado.

Nombres comunes de especies similares. Nuez de calatola (Ver., Pue.); bone (tzeltal, zona lacandona, (Chis.); duraznillo (Chis.); onmanchinte (Chis.).

Dist. & Hábitat. Se distribuye en la vertiente del Golfo desde el centro de Ver. y noroeste de Pue. hasta el norte de Chis., la selva Lacandona y la región de Los Chimalapas, y en la del Pacífico en Jal., Mich. y Guerrero hasta Chiapas. 300 a 600 msnm.

Relaciones interespec. Se asocia frecuentemente con *Cajoba arborea, Hymenea coubaril, Diospyros nigra*.



RED DE VIVEROS
DE BIODIVERSIDAD



FGM
Fondo Gollo de México



REFERENCIAS

- Pennington, T. y Sarukhán, J. 2005. Árboles tropicales de México. Manual para la identificación de las principales especies. UNAM, FCE, México.
- Pronatura Veracruz. Información original.



Corteza. Escamosa, a veces con lenticelas grandes, pardo amarillentas.




Flor. Panículas terminales, de hasta 30 cm de largo, pubescentes; flores sobre pedicelos de 1 a 3 mm de largo, de aroma dulce.



Ramas & hojas. Ramas horizontales y luego colgantes. Hojas alternas, ocasionalmente dispuestas en espiral, simples; láminas de 17 x 5 a 30 x 9 cm, oblanceoladas; oblongas o elípticas, margen entero, ápice agudo u obtuso con un corto acumen.





Estructura de flor. Drupas monospermas obovoides o irregulares, aproximadamente de 14x12 cm, de superficie moreno amarillenta; rugosa, mesocarpio carnoso ligeramente fibroso, amarillo de olor y sabor dulce; semilla de hasta 10x6 cm, ovoide o globosa.


Descripción del fruto. Fruto, una drupa de 14x12 cm.

Diagnosis; otras spp. Hipógea. Una vez sembrada la semilla, se requieren 60 días para completar la germinación



Usos & comerc. Aunque su madera es de notable dureza y su tronco tiene forma adecuada para ser maderable, no se utiliza industrialmente. El fruto se come en algunas de las zonas donde crece la especie silvestre o semicultivada.





Germinación. Recalcitrante. 11 semillas/ kg.


Manejo y almacenamiento. Es una semilla recalcitrante.

Dispersión. De octubre a diciembre.
Zoocoria. Los frutos son ingeridos por animales y después excretados a ciertas distancias.

Depredación. Hormigas.

Fenología. Flor: Enero - Marzo
Fruto: Marzo - Octubre

Distribución geográfica. En México se encuentra en los estados de Chiapas, Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Puebla, Tabasco y Veracruz. También vive en algunos países de Centro y Sudamérica.



Distribución geográfica

